

11. Novemb. 1673. Methodi tangentium inversae exempla.

Jam superest unum vel alterum pro specimen adjungam quo ostendam quomodo difficillimae quaestiones ad hanc Geometriae partem pertinentes vel adeo quod vix credibile methodi tangentium inversae exempla: Nimirum quaeratur



Curva C(C) in qua intervalla ordinatarum BC, ex punctis curvae PC, in axe AB(B) sumtis, sint ipsis ordinatis BC ad curvam PC, in axe AB(B) sumtis, sint ipsis ordinatis BC reciprocè proportionalia. Sit alia recta A(B) ad ipsam A B perpendicularis, in quam ducantur ordinatae CD ita ut ipsae AD ad ipsas ordinatas BC ejusdem curvae PC reciprocè sint proportionales, ita ut ipsae AD ipsis BC ordinatis ad axem AB(B) aequales sint. Quaeritur ipsius AB(B) relatio ad ipsas AD. Sit ipsa AB = x, ipsae BC = y, ipsae AD = z. Quaeritur relatio inter x et z. Ex natura curvae C(C) est $y \propto \frac{1}{x}$. Ex natura curvae P(P) est $z \propto \int y$. Ergo $z \propto \int \frac{1}{x}$. Ex natura curvae A(B) est $z \propto x$. Ergo $x \propto \int \frac{1}{x}$. Ergo $x \propto \log z$. Ergo $z \propto e^x$. Ergo curva A(B) est Logarithmica.

Ex hoc exemplo patet, quomodo ex data relatione inter ordinatas curvae et intervalla ordinatarum ab axe abscissa, invenienda sit relatio inter ordinatas curvae et abscissas axis. Quod ubi semel praestitum est, tangentes curvae inventae ex methodo tangentium directa facile ducuntur. Ita ex. gr. si curva quaedam ejusmodi inventa sit, cujus ordinatae sint ut cubi abscissarum, curva ipsa erit Parabola Cubica, cujus vertex A. Ducatur ergo ad eam tangens quaelibet BT. Quaeritur ratio BA ad AT. Sit BA = x, AT = t, BT = y. Ex natura curvae $x \propto y^3$. Ergo $t \propto \frac{y^3}{3y^2}$. Ergo $t \propto \frac{y}{3}$. Ergo $t \propto \frac{x}{3}$. Ergo AT = $\frac{1}{3}$ AB.

Videtur ergo an verum sit hoc Theorema sane memorabile: "In Parabola Cubica C(C) sunt intervalla perpendicularium BP ad curvam PC et ordinatarum BC ad axem in axe AB(B) sumtis ipsis ordinatis BC reciprocè proportionalia. Hoc calculo tangentium facile ostendetur. Aequatio Parabolae cubicae est $x c^2 \propto y^3$. Ponendo c latere recto, sive pro c^2 ponendo 3ba, fiet $c \propto \sqrt{3ba}$, fiet: $3xba \propto y^3$. Ergo ex methodo tangentium facilis est $t \propto \frac{3y^3}{3ba}$, ponendo BT = t. Intervalla inter tangentem et ordinatam in axe: jam BP = $\omega \propto \frac{y^2}{t}$. Ergo $\omega \propto \frac{y^2}{\frac{y^3}{ba}} \propto \frac{ba}{y}$. Sunt ergo ipsae ω ipsis y reciprocè proportionales quod desiderabatur.

Analyseos hujus artificium in eo fuit, quod ex ordinata abscissam facerem: cui cum Stereometria antea non veneratur in mentem, non est difficilis pateat retectu quaestio, si quaeratur curva in qua ipsae BT ipsa intervalla ordinatarum et perpendicularium sint ipsis AB abscissis reciprocè proportionales. Nempe $\omega \propto \frac{a^2}{x}$. Et vel $\int y \frac{a^2}{x}$: jam $\int \omega \propto \frac{y^2}{2}$. Ergo $y \propto \sqrt{2 \int \omega}$ Hinc $\int \omega$ non posse inveniri nisi ope curvae Logarithmicae. Ergo ut figurae quae satisfaciat est Logarithmica. Et in subduplicata ratione Logarithmorum ab ordinatis curvae sunt in subduplicata ratione Logarithmorum ad abscissas quae figurae et ex numero transcendentium. At relatio subtilior est quaesita, cum quaeritur ne ipsae AP sint ipsis BC ordinatis reciprocè proportionales. Nempe $x + \omega \propto \frac{a^2}{y}$ et $\int z \propto x$ sive $z \propto \frac{x}{a}$ sive fiet: $\frac{y^2}{2a} \propto \omega \frac{x}{a} \propto \frac{y^2}{2a} \frac{x}{2}$. Et fiet: $x + \frac{y^2 x}{2a \cdot 2} \propto \frac{a^2}{y}$ 1

ponendo ipsius x aliquem valorem, sit $\frac{x}{2} \propto z$ et fiet: $x + z y \propto \frac{a^2}{y}$ et $\int x \propto \int \frac{a^2}{y} - \frac{y^2}{2}$. Et $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \propto \int \frac{a^2}{y}$ sive $\sqrt{x^2+y^2} \propto \int \frac{a^2}{y}$ in qua curva ordinatae sunt ut abscissae ex vertice sive Jam

jam punctis AC, A(C) [illegible] $\sqrt{x^2+y^2}$. Centro A, radio AC describatur arcus C ε, ita ut radius in rectam A ε(C) / cadat ipsa ε(C) differentiae inter AC et A(C), sive εC = ε = $\sqrt{dx^2+dy^2}$.

Ergo ε = $\frac{2a^2}{y}$. Si ergo literae y similes arithmetice per progressionis tabulam quaeritur, videtur tamen nihil de reperi ipsi x progressionis arithmeticae fumpsimus. Sumtis enim x progressionis Arithmeticae, sequitur ipsius AD sive y, esse ipsas BC sive ε reciprocae proportionales esse. Quod si autem sunt semel, eruntur semper. Summa autem infinitarum reciprocae proportionalium tabetur quidem cuius progressionis sed ea quibus reciprocae proportionales sumuntur, neq enim hic rectangulorum alia: atqui tabetur, ubi ergata altitudines ipsis BC, summa omnium sublatis EC) initur. Sed jam vidi difficillimum ipsum omnium $\frac{2a^2}{y}$ sive omnes sunt ipsae A(C) non tabetur, nisi scitur cuius progressionis sint ipsae y. Quod hic non ignoratur. Summam ipsius x' nescire ea esse progressionis arithmeticae non ipsius y.

Nota idem est dx. ipsi et $\frac{x}{a}$. ideo differentia inter duas x progressionis.

Sit jam ut aequatione superiore $x + \frac{y}{a}\sqrt{\ldots} \sqcap \frac{a^2}{y}$ summa y. progressionis Arithmeticae, fiet: $x + \frac{y\,dx}{dy} \sqcap \frac{a^2}{y}$. et $xy + \frac{y^2 dx}{dy} \sqcap a^2$. ⊙ ad inventa generalia revertendo applicando, progressionem, fiet: $xy + \frac{y^2 dx}{dy} \sqcap a^2$. sed mundum priorem progressum, considerandum ergo ex doctrina infinitorum esse productis P.C.S. Sumtis AD aequales ipsi y esse summa omnium applicatarum AP ex [illegible] applicatis ad AB, equalem summae omnium AS applicatarum ad [illegible] AD. id ex [illegible] vocando DS, $\sqcap v$. fiet

$dy\int y + y\int dy \sqcap dx\int x + dx\int \omega$. Sive $\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} \sqcap$ [illegible] dx $\int \omega$ sive $dy\int y + dy\int v \sqcap$ [illegible] $dx\int\frac{a^2}{y}$ [illegible] jam y. progressionis Arithmeticae, fiet. $\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} \sqcap$ [illegible] $dx\,\mathrm{Log}\,y$. At paulo ante eadem facta suppositione ipsarum y progressionis Arithmeticae fuit $xy + \frac{y^2 dx}{dy} \sqcap a^2$ fiet:

$dx \sqcap \frac{y^2}{a^2 - yx}$ at [illegible] si $dx \sqcap \frac{y^2+x^2}{2\,\mathrm{Log}\,y}$. ergo [illegible] $y+x^2$, $a^2-yx \sqcap 2y^2\,\mathrm{Log}\,y$ ut quae forte suspicari x. et y. certa vinculo, tempe: [illegible] quae aequatio cum sit determinata locum habet quaestionem. Et valde memorabile est hanc methodum, cum enim non possit ad nostra praecepta tot aequationes tollere, tamen saepe plurimas obtinere aequationes, et tandem post indignitates, posterius tamen saepe plurimas obtinere aequationes, et earum ope quodcunque terminos elidere, et tandem unicam dx. quae forte nobis obstrabat. Singulae aequationes totam incubebant quaestionis naturam, nec tamen ea ex eis perfecta solutio, quod media fuerint nobis. Sed sine conjunctis tantum aequationum rem perficere solutio, quod media fuerint nobis. Sed sine conjunctis tantum aequationum rem perficere solutio, quod media fuerint nobis. Videri idem alias obtinere potuisse per momenta. Ubi in tantum complendo desit.

fig. 2.



Obiter consideratio nova non incongruens. In fig. 2. est BC$\sqcap y$. FC$\sqcap\sqrt{y}$ sit punctum G medium ipsius FC. fiet tandem ipsius FC, esse rectangulum sub FC et BG, id est rectangulum BFC. nam cum sit BFC + BGFC. posterius propter priorem rationem similis ratione ubique patet, adeo erit [illegible] $\int y\sqrt{y} \sqcap \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}$ sive momentum omnium differentiarum FC, aequalem ultimi termini momento. Et $y\,dy \sqcap d\frac{y^2}{2}$ et $y^2\,dy \sqcap y\frac{dy^2}{2}$. Porro supra in aq. ⊙ faciendo x arithmeticam, fiet: [illegible] fiet $y\,d\frac{y^2}{2} \sqcap a^2 - xy$ sive $\int d\frac{y^2}{2} \sqcap \frac{a^2-xy}{y}$ at [illegible] $\int y\,dy \sqcap \int a^2 - \int xy$ sive $\int y\,dy \sqcap \frac{a^2-xy}{y}$. ergo $y\,dy \sqcap \frac{a^2-xy}{y}$. et erit

$\int y\sqrt{y} \sqcap \int\frac{a^2}{y} - (\int x)\frac{x^2}{2}$. at jam inveniemus esse $\int y\,dy \sqcap \frac{y^2}{2}$ fiet ergo $y^2 + x^2 \sqcap 2\int\frac{a^2}{y}$. ut ante fuit $\frac{y^2}{2} + x \sqcap 2a^2$. ubi facilis resolubilis in hac aequationis, in quibus reperiuntur $\int$ et $\frac{d}{dx}$. ubi jam una, vix hic x. pro methodi praecedentis formula ea non possit jam invenitur, sed nec dici hoc tabulae valorem ipsius x, nempe $x \sqcap \frac{2a^2}{y} - \frac{y^2}{2}$. quae $\frac{y^2}{2}$ non potest intelligi nisi: determinata progressionis naturae, ipsius y. ipsius y. autem progressio at differentialis talis summa potest, debet ut sui x progressionis Arithmeticae, ergo ipse $\frac{y^2}{2}$ suppositum ipsius x, non ergo pro ipsius inventione x. Certum hac arte multa pulcherrima formularia tabulis trigonometricis de curvis aliis in tractatibus, pungendo subtilitate plurimi aequationis.

Ut in longitudinibus curvarum difficillimis, ita in quadraturis [illegible] operationes inde exit ultra unam operari, ut scilicet ipsae AB sint ipsis AB reciprocae proportionales: fiet: $x + \omega \sqcap \frac{a^2}{x}$. et $2\omega \sqcap \int dy^2$. et $2 \sqcap dx$. adeo fiet: $x + \omega \sqcap \frac{\frac{dy^2}{2}}{dx}$. et $\omega \sqcap \frac{\frac{dy^2}{2}}{dx}\cdot x$. ergo $x + \frac{\sqrt{y}}{\frac{dy}{dx}} \sqcap \frac{a^2}{x}$. cujus jam non difficilis solutio ejusmodi quaerendo x arithmeticas, fiet: $\int x + \frac{y^2}{2} \sqcap \int\frac{a^2}{x}$, sive fiet: $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \sqcap$ [illegible] $\log y$ sive $\sqrt{x^2+y^2} \sqcap AC \sqcap$ [illegible] $\sqrt{2}\,\mathrm{Log}\,AP$ quae aequatio curva satis est simplex. Reperiuntur autem ipsae AP. progressionis [illegible] arithmeticae. Ordinata si sint y progressionis arithmeticae fiet: $x + \frac{y}{dx} \sqcap \frac{a^2}{x}$. [illegible] esse sed linea non finita tabulam naturae curvae.

Videamus an possit esse curva in qua ipsae AC ipsis BP reciprocales, fiet: $\sqrt{x^2+y^2} \sqcap \omega$. et $\omega \sqcap \frac{dy^2}{2dx}$. sit x progressionis arithmeticae, fiet: ——— $\left(\int\sqrt{x^2+y^2}\sqcap\right)\int AC \sqcap y^2$. sed hae non sufficiunt nisi ad [illegible] curvam mechanicae describendam, sed punctum finitae progressionis tabulandum. ut sit $x \sqcap 1$. [illegible] sit [illegible] AP. $BC \sqcap (y)$ erit $\sqrt{1+(y)^2} \sqcap (y')$ sive $1 + (y)^2 \sqcap (y')^2$. unde tabulae (y) semper $y^4 - y^2 + \frac{1}{4} \sqcap 1 + \frac{1}{4}$ sive $(y^2) \sqcap \frac{\sqrt{5}}{2}$. et $(y) \sqcap \frac{\sqrt{\text{[illegible]}5}}{\sqrt{2}}$. [illegible] $\sqrt{\frac{1}{2}+(y)^2}$ [illegible] $\sqcap (y^2)$

Vita mihi pulchra videtur (y). Et sunt quae repetendo tantum AC ex ita AC reciprocatim proportionem aliquod amantibus quaestio ea similis, quae major aequatio qui multum (citra descriptionem) x. esse progressionis arithmeticae figuram at multum (citra descriptionem) in aqc AB. c[illegible] unitas ducatur; Reciprocatio autem quae fit ipsarum motus alibi esse inventum non [illegible] pulchra. Nec enim proprium [illegible] inventum aut formulam, nisi gratiae in doctrina, sed quod $2\frac{x}{y}$ [illegible] tandem an $dx\,dy$; idem sit quod $d\frac{xy}{dy}$ ex an $\frac{dx}{dy}$. idem quod $2\frac{x}{y}$ est videtur mihi ut sit $by \sqcap z^2 + bz$. erit $\frac{c}{2}x$ sit $\frac{c}{2}z^2 + d$. fiet $dy \sqcap \left(\frac{c}{2}x^2 + \beta z + \frac{b}{2}\beta^2\right) + b\beta, (-z^2 - b\beta)$ et fiet $dy \sqcap \frac{c}{2}z^2 + b\beta$ - unde $dx \sqcap +c\beta$. et [illegible] $dz\,dx \sqcap \frac{c}{2}z^2 + b\beta^2$ Ad idem pervenit [illegible] $\frac{dy}{dxy}$ idem [illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] [illegible]

jam punctis AC, A(C) [illegible] $\sqrt{x^2+y^2}$. Centro A, radio AC describatur arcus C ε, ita ut radius in rectam A ε(C) / cadat ipsa ε(C) differentiae inter AC et A(C), sive εC = ε = $\sqrt{dx^2+dy^2}$.

Ergo ε = $\frac{2a^2}{y}$. Si ergo literae y similes arithmetice per progressionis tabulam quaeritur, videtur tamen nihil de reperi ipsi x progressionis arithmeticae fumpsimus. Sumtis enim x progressionis Arithmeticae, sequitur ipsius AD sive y, esse ipsas BC sive ε reciprocae proportionales esse. Quod si autem sunt semel, eruntur semper. Summa autem infinitarum reciprocae proportionalium tabetur quidem cuius progressionis sed ea quibus reciprocae proportionales sumuntur, neq enim hic rectangulorum alia: atqui tabetur, ubi ergata altitudines ipsis BC, summa omnium sublatis EC) initur. Sed jam vidi difficillimum ipsum omnium $\frac{2a^2}{y}$ sive omnes sunt ipsae A(C) non tabetur, nisi scitur cuius progressionis sint ipsae y. Quod hic non ignoratur. Summam ipsius x' nescire ea esse progressionis arithmeticae non ipsius y.

Nota idem est dx. ipsi et $\frac{x}{a}$. ideo differentia inter duas x progressionis.

Sit jam ut aequatione superiore $x + \frac{y}{a}\sqrt{\ldots} \sqcap \frac{a^2}{y}$ summa y. progressionis Arithmeticae, fiet: $x + \frac{y\,dx}{dy} \sqcap \frac{a^2}{y}$. et $xy + \frac{y^2 dx}{dy} \sqcap a^2$. ⊙ ad inventa generalia revertendo applicando, progressionem, fiet: $xy + \frac{y^2 dx}{dy} \sqcap a^2$. sed mundum priorem progressum, considerandum ergo ex doctrina infinitorum esse productis P.C.S. Sumtis AD aequales ipsi y esse summa omnium applicatarum AP ex [illegible] applicatis ad AB, equalem summae omnium AS applicatarum ad [illegible] AD. id ex [illegible] vocando DS, $\sqcap v$. fiet

$dy\int y + y\int dy \sqcap dx\int x + dx\int \omega$. Sive $\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} \sqcap$ [illegible] dx $\int \omega$ sive $dy\int y + dy\int v \sqcap$ [illegible] $dx\int\frac{a^2}{y}$ [illegible] jam y. progressionis Arithmeticae, fiet. $\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} \sqcap$ [illegible] $dx\,\mathrm{Log}\,y$. At paulo ante eadem facta suppositione ipsarum y progressionis Arithmeticae fuit $xy + \frac{y^2 dx}{dy} \sqcap a^2$ fiet:

$dx \sqcap \frac{y^2}{a^2 - yx}$ at [illegible] si $dx \sqcap \frac{y^2+x^2}{2\,\mathrm{Log}\,y}$. ergo [illegible] $y+x^2$, $a^2-yx \sqcap 2y^2\,\mathrm{Log}\,y$ ut quae forte suspicari x. et y. certa vinculo, tempe: [illegible] quae aequatio cum sit determinata locum habet quaestionem. Et valde memorabile est hanc methodum, cum enim non possit ad nostra praecepta tot aequationes tollere, tamen saepe plurimas obtinere aequationes, et tandem post indignitates, posterius tamen saepe plurimas obtinere aequationes, et earum ope quodcunque terminos elidere, et tandem unicam dx. quae forte nobis obstrabat. Singulae aequationes totam incubebant quaestionis naturam, nec tamen ea ex eis perfecta solutio, quod media fuerint nobis. Sed sine conjunctis tantum aequationum rem perficere solutio, quod media fuerint nobis. Sed sine conjunctis tantum aequationum rem perficere solutio, quod media fuerint nobis. Videri idem alias obtinere potuisse per momenta. Ubi in tantum complendo desit.

fig. 2.



Obiter consideratio nova non incongruens. In fig. 2. est BC$\sqcap y$. FC$\sqcap\sqrt{y}$ sit punctum G medium ipsius FC. fiet tandem ipsius FC, esse rectangulum sub FC et BG, id est rectangulum BFC. nam cum sit BFC + BGFC. posterius propter priorem rationem similis ratione ubique patet, adeo erit [illegible] $\int y\sqrt{y} \sqcap \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}$ sive momentum omnium differentiarum FC, aequalem ultimi termini momento. Et $y\,dy \sqcap d\frac{y^2}{2}$ et $y^2\,dy \sqcap y\frac{dy^2}{2}$. Porro supra in aq. ⊙ faciendo x arithmeticam, fiet: [illegible] fiet $y\,d\frac{y^2}{2} \sqcap a^2 - xy$ sive $\int d\frac{y^2}{2} \sqcap \frac{a^2-xy}{y}$ at [illegible] $\int y\,dy \sqcap \int a^2 - \int xy$ sive $\int y\,dy \sqcap \frac{a^2-xy}{y}$. ergo $y\,dy \sqcap \frac{a^2-xy}{y}$. et erit

$\int y\sqrt{y} \sqcap \int\frac{a^2}{y} - (\int x)\frac{x^2}{2}$. at jam inveniemus esse $\int y\,dy \sqcap \frac{y^2}{2}$ fiet ergo $y^2 + x^2 \sqcap 2\int\frac{a^2}{y}$. ut ante fuit $\frac{y^2}{2} + x \sqcap 2a^2$. ubi facilis resolubilis in hac aequationis, in quibus reperiuntur $\int$ et $\frac{d}{dx}$. ubi jam una, vix hic x. pro methodi praecedentis formula ea non possit jam invenitur, sed nec dici hoc tabulae valorem ipsius x, nempe $x \sqcap \frac{2a^2}{y} - \frac{y^2}{2}$. quae $\frac{y^2}{2}$ non potest intelligi nisi: determinata progressionis naturae, ipsius y. ipsius y. autem progressio at differentialis talis summa potest, debet ut sui x progressionis Arithmeticae, ergo ipse $\frac{y^2}{2}$ suppositum ipsius x, non ergo pro ipsius inventione x. Certum hac arte multa pulcherrima formularia tabulis trigonometricis de curvis aliis in tractatibus, pungendo subtilitate plurimi aequationis.

Ut in longitudinibus curvarum difficillimis, ita in quadraturis [illegible] operationes inde exit ultra unam operari, ut scilicet ipsae AB sint ipsis AB reciprocae proportionales: fiet: $x + \omega \sqcap \frac{a^2}{x}$. et $2\omega \sqcap \int dy^2$. et $2 \sqcap dx$. adeo fiet: $x + \omega \sqcap \frac{\frac{dy^2}{2}}{dx}$. et $\omega \sqcap \frac{\frac{dy^2}{2}}{dx}\cdot x$. ergo $x + \frac{\sqrt{y}}{\frac{dy}{dx}} \sqcap \frac{a^2}{x}$. cujus jam non difficilis solutio ejusmodi quaerendo x arithmeticas, fiet: $\int x + \frac{y^2}{2} \sqcap \int\frac{a^2}{x}$, sive fiet: $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \sqcap$ [illegible] $\log y$ sive $\sqrt{x^2+y^2} \sqcap AC \sqcap$ [illegible] $\sqrt{2}\,\mathrm{Log}\,AP$ quae aequatio curva satis est simplex. Reperiuntur autem ipsae AP. progressionis [illegible] arithmeticae. Ordinata si sint y progressionis arithmeticae fiet: $x + \frac{y}{dx} \sqcap \frac{a^2}{x}$. [illegible] esse sed linea non finita tabulam naturae curvae.

Videamus an possit esse curva in qua ipsae AC ipsis BP reciprocales, fiet: $\sqrt{x^2+y^2} \sqcap \omega$. et $\omega \sqcap \frac{dy^2}{2dx}$. sit x progressionis arithmeticae, fiet: ——— $\left(\int\sqrt{x^2+y^2}\sqcap\right)\int AC \sqcap y^2$. sed hae non sufficiunt nisi ad [illegible] curvam mechanicae describendam, sed punctum finitae progressionis tabulandum. ut sit $x \sqcap 1$. [illegible] sit [illegible] AP. $BC \sqcap (y)$ erit $\sqrt{1+(y)^2} \sqcap (y')$ sive $1 + (y)^2 \sqcap (y')^2$. unde tabulae (y) semper $y^4 - y^2 + \frac{1}{4} \sqcap 1 + \frac{1}{4}$ sive $(y^2) \sqcap \frac{\sqrt{5}}{2}$. et $(y) \sqcap \frac{\sqrt{\text{[illegible]}5}}{\sqrt{2}}$. [illegible] $\sqrt{\frac{1}{2}+(y)^2}$ [illegible] $\sqcap (y^2)$

Vita mihi pulchra videtur (y). Et sunt quae repetendo tantum AC ex ita AC reciprocatim proportionem aliquod amantibus quaestio ea similis, quae major aequatio qui multum (citra descriptionem) x. esse progressionis arithmeticae figuram at multum (citra descriptionem) in aqc AB. c[illegible] unitas ducatur; Reciprocatio autem quae fit ipsarum motus alibi esse inventum non [illegible] pulchra. Nec enim proprium [illegible] inventum aut formulam, nisi gratiae in doctrina, sed quod $2\frac{x}{y}$ [illegible] tandem an $dx\,dy$; idem sit quod $d\frac{xy}{dy}$ ex an $\frac{dx}{dy}$. idem quod $2\frac{x}{y}$ est videtur mihi ut sit $by \sqcap z^2 + bz$. erit $\frac{c}{2}x$ sit $\frac{c}{2}z^2 + d$. fiet $dy \sqcap \left(\frac{c}{2}x^2 + \beta z + \frac{b}{2}\beta^2\right) + b\beta, (-z^2 - b\beta)$ et fiet $dy \sqcap \frac{c}{2}z^2 + b\beta$ - unde $dx \sqcap +c\beta$. et [illegible] $dz\,dx \sqcap \frac{c}{2}z^2 + b\beta^2$ Ad idem pervenit [illegible] $\frac{dy}{dxy}$ idem [illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] [illegible]



11. Novemb. 1673. Methodi tangentium inversae exempla.